

# Tabla de Vacunación para Adolescentes de 11 a 18 años de edad



Vacuna	Dosis	Calendario de Inmunización
Hepatitis B (Hep B) <sup>1</sup>	3 dosis	1º dosis / 2º dosis, 1 mes después de la 1º dosis 3º dosis, 4-6 meses después de la 2º dosis
Sarampión, Paperas, Rubeola (MMR) <sup>2</sup>	2 dosis	1º dosis / 2º dosis, 1 mes después de la 1º dosis
Varicela (Chickenpox) <sup>3</sup>	2 dosis	1º dosis / 2º dosis, 1-3 meses después de la 1º dosis, según la edad
Hepatitis A (Hep A) <sup>4</sup>	2 dosis	1º dosis / 2º dosis, 6-12 meses después de la 1º dosis
Influenza (Flu) <sup>5</sup>	1 dosis	1 dosis anual
Neumocócica <sup>6</sup>	1 dosis	1 dosis a adolescentess que tengan enfermedades serias.
Meningocócica Conjugada (MenACWY) <sup>7</sup>	2 dosis	1 dosis es recomendada a los 11-12 años de edad con dosis de resfuerzo a los 16 años de edad.
Tdap (Tétanos, Difteria, Tos ferina) <sup>8</sup>	1 dosis	1 dosis de Tdap es recomendada a los 11-12 años de edad
Virus de Papiloma Humano (HPV) <sup>9</sup>	2 dosis o 3 dosis	<b>Vacuna inicial entre los 9 y 14 años de edad:</b> 1º dosis / 2º dosis, 6-12 meses después de la 1º dosis <b>Vacuna inicial a partir de los 15 años de edad:</b> 1º dosis / 2º dosis, 1-2 meses después de la 1º dosis 3º dosis, 6 meses después de la 1º dosis
Meningocócica B <sup>10</sup>	2 dosis o 3 dosis	1º dosis / 2º dosis, 1 mes después de la 1º dosis 1º dosis / 2º dosis, 6 meses después de la 1º dosis 3º dosis, 4 meses después de la 2º dosis

Vea el reverso para recomendaciones detalladas

**Línea Directa:** 1-800-275-0659 | [www.immunize-utah.org](http://www.immunize-utah.org)

**<sup>1</sup> Hepatitis B:** Para una protección completa, se necesitan tres dosis de vacuna para hepatitis B. Hay una vacuna contra la hepatitis B de dos dosis para adolescentes entre 11 y 15 años de edad. Los adolescentes mayores de 18 años pueden recibir una serie de 2 dosis de Hep B (Heplisav-B) o la vacuna combinada Hep A y Hep B, Twinrix, en una serie de 3 o 4 dosis.

**<sup>2</sup> Sarampión, Paperas y Rubeola (MMR):** Para una protección completa a adolescentes que no han sido previamente vacunados, se recomiendan dos dosis de vacuna MMR. La vacuna MMR no debe administrarse a adolescentes que estén embarazadas o que estén considerando quedar embarazadas dentro del mes siguiente a ser vacunadas.

**<sup>3</sup> Varicela:** La vacuna contra la varicela se recomienda para cualquier persona que no haya tenido la enfermedad de la varicela o que no la haya sido vacunada contra dicha enfermedad. La vacuna contra la varicela no debe administrarse a adolescentes que estén embarazadas o que estén considerando quedar embarazadas dentro del mes siguiente a ser vacunadas.

**<sup>4</sup> Hepatitis A:** Se recomiendan dos dosis de vacuna contra hepatitis A para quienes no han sido previamente vacunados

**<sup>5</sup> Influenza (Flu):** Se recomienda una vacuna de influenza anual para los adolescentes.

**<sup>6</sup> Vacuna neumocócica:** Se recomienda una dosis única de la vacuna neumocócica conjugada para adolescentes con enfermedades graves como diabetes, leucemia, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, infección por VIH o SIDA.

**<sup>7</sup> Meningocócica Conjugada (MenACWY):** Se recomiendan dos dosis de la vacuna meningocócica conjugada (MCV) para adolescentes. La primera dosis se recomienda a los 11-12 años con un refuerzo a los 16 años. Los adolescentes que recibieron MCV por primera vez entre los 13 y 15 años necesitarán un solo refuerzo entre los 16 y 18 años.

**<sup>8</sup> Tdap (Tétanos, Difteria, Tos ferina):** Se recomienda una dosis de la vacuna Tdap para adolescentes. Los adolescentes de 11 a 18 años que no han recibido la vacuna Tdap deben recibir una dosis única de Tdap. Se recomienda una dosis de la vacuna Tdap durante cada embarazo (preferiblemente entre las 27 y 36 semanas de gestación), independientemente del tiempo transcurrido desde la vacunación Td o Tdap previa.

**<sup>9</sup> Virus de Papiloma Humano (HPV):** Dependiendo de la edad de la vacuna inicial, se recomiendan 2 o 3 dosis de la vacuna contra el VPH para todos los adolescentes de 11 a 12 años (puede comenzarse a los 9 años) y hasta los 18 años si no se vacunaron antes en forma apropiada.

**<sup>10</sup> Meningocócica B:** Según lo decida el proveedor de atención médica particular, se recomiendan 2 o 3 dosis (según la marca) de vacuna meningocócica B para adolescentes entre los 16 a 23 años (preferiblemente entre los 16 a 18 años) que no tengan mayor riesgo de infección por meningitis bacteriana.