




# Inmunización de Niños



1-800-275-0659 | [www.immunize-utah.org](http://www.immunize-utah.org)

Vea el reverso para los requisitos de guarderías de cuidado diario con licencia y de las escuelas.



Para más información, consulte con su proveedor de salud y/o el “Recommended Childhood Immunization Schedule, United States” que está en [www.cdc.gov/vaccines](http://www.cdc.gov/vaccines).

- 1 Series de Hepatitis B: La vacuna contra la Hepatitis B es una serie de tres dosis. Si no se administra la vacuna contra la Hepatitis B al nacer, la primera dosis se puede administrar a los 2 meses de edad. La segunda dosis debe ser administrada a los 4 meses de edad. La tercera dosis debe ser administrada a las  $\geq 24$  semanas de edad. Si se utiliza la vacuna combinada ComVax® (combinado Hib y Hepatitis B), una cuarta dosis se puede dar. Al utilizar Comvax®, la dosis final se da a los 12-15 meses de edad.
- 2 La vacuna RotaTeq® es una serie de tres dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad. Vacuna Rotarix® es una serie de dos dosis que se administran a los 2 y 4 meses de edad. La vacunación con cualquiera de estas vacunas contra el rotavirus no se debe iniciar para los niños de 15 semanas de edad o mayores. Todas las dosis se deben terminar a los 8 meses de edad.
- 3 El número de dosis de la serie de Hib depende del tipo de vacuna que se utilice. La vacuna contra el Hib que tiene una serie de dosis de seis meses puede omitirse si se utilizan determinadas combinaciones de vacunas (Pedvax® y/o Comvax®).
- 4 Si se utiliza la vacuna Pentacel® (DTaP, IPV, Hib), se puede administrar una cuarta dosis de IPV a los 12-15 meses de edad. Para ingresar a la escuela, una dosis de IPV debe ser dada a los  $\geq 4$  años de edad.
- 5 La última dosis de las vacunas Hib y Neumocócica (PCV) deben administrarse a los  $\geq 12$  meses de edad.
- 6 La cuarta dosis de DTaP puede administrarse tan temprano como a la edad de 12 meses, siempre y cuando por lo menos 6 meses hayan pasado desde la tercera dosis. Para ingresar a la escuela, una dosis de DTaP se debe dar a los  $\geq 4$  años de edad.

## Programa de Inicio Niñez Temprana

*(Según la edad apropiada)*

DTaP | Polio | Hib | Neumocócica  
Hepatitis A | Hepatitis B  
MMR | Varicela

## Inicio en Kindergarten

DTaP | Polio | MMR | Varicela  
Hepatitis A | Hepatitis B

1-800-275-0659 | [www.immunize-utah.org](http://www.immunize-utah.org)

